

Tab.4 Kurzzeitmorbidity: Gehirnblutungen (IVH), Frühgeborenenretinopathie (ROP) und nekrotisierende Enterokolitis (NEC) bei Früh- und Neugeborenen mit einem Geburtsgewicht <1500g (in Absolutzahlen und in Prozent)

Geburtsjahrgang 2009						
Gewichtsklasse	<500g	500-749g	750-999g	1000-1249g	1250-1499g	<1500g (Summe)
Anzahl der Kinder	1	7	6	9	19	42
nicht sonographiert, n (%)	0	0	0	0	0	0 (0%)
keine IVH, n (%)		5	5	8	17	35 (83%)
IVH Grad 1, n (%)						0 (0%)
IVH Grad 2, n (%)	1	1		1	1	4 (10%)
IVH Grad 3, n (%)		1	1			2 (5%)
IVH Grad 4, n (%)						0 (0%)
Fundus nicht untersucht, n (%)						0 (0%)
Retinopathie (ROP) mit Operation, n (%)			1			1 (2%)
NEC mit Operation oder Verlegung, n (%)		2			1	3 (7%)
Entlassung nach Hause ohne IVH > II°, ohne zusätzlichen Sauerstoffbedarf, ohne Operation einer NEC und ohne Laser- oder Kryotherapie einer ROP, n (%)	0	3	4	9	17	33 (79%)